

ANEXO I- SALA DE VACINAS- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

SALA DE VACINA SEDE/AMA- HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO	
VACINAS	PERÍODO DE APLICAÇÃO
BCG	<i>Essa vacina é ofertada somente na Sala de vacina da Sede/Ama de segunda a sexta 07:00- 11:00 horas</i>
Hepatite B	Segunda a sexta-feira: 07:20- 16:00 horas
Pólio oral (VOP)	Segunda a sexta-feira: 07:20- 16:00 horas
Pólio inativa (VIP)	Segunda a sexta-feira: 07:20- 16:00 horas
Rota vírus	Segunda a sexta-feira: 07:20- 16:00 horas
Pneumocócica 10	Segunda a sexta-feira: 07:20- 16:00 horas
Pentavalente	Segunda a sexta-feira: 07:20- 16:00 horas
Meningocócica C	Segunda a sexta-feira: 07:20- 16:00 horas
Tríplice viral	Segunda a sexta-feira: 07:20- 16:00 horas
DTP	Segunda a sexta-feira: 07:20- 16:00 horas
HPV	Segunda a sexta-feira: 07:20- 16:00 horas
Dupla adulto	Segunda a sexta-feira: 07:20- 16:00 horas
Febre amarela	Segunda a sexta-feira: 07:20- 16:00 horas
DTPa	Segunda a sexta-feira: 07:20- 16:00 horas
	Essa vacina é ofertada somente na ESF Sede/ Ama de segunda a sexta-feira:

Vacina contra a raiva	07:20- 16:00 horas Hospital Concórdia: horário integral
Vacina influenza	Vacina disponibilizada em período de campanha: 13 de abril a 15 de maio de 2020, <u>sendo 25 de abril, o dia D de mobilização nacional</u>

SALA DE VACINA ESF BARRA DO RIO CLARO- HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO	
VACINAS	PERÍODO DE APLICAÇÃO
BCG	<i>Essa vacina é ofertada somente na Sala de vacina da Sede/Ama de segunda a sexta 07:00- 11:00 horas</i>
Hepatite B	Segunda a sexta-feira: 07:00- 16:00 horas
Pólio oral (VOP)	Quartas-feiras: 07:00- 16 horas (otimização das doses)
Pólio inativa (VIP)	Segunda a sexta-feira: 07:00- 16:00 horas
Rota vírus	Segunda a sexta-feira: 07:00- 16:00 horas
Pneumocócica 10	Segunda a sexta-feira: 07:00- 16:00 horas
Pentavalente	Segunda a sexta-feira: 07:00- 16:00 horas
Meningocócica C	Segunda a sexta-feira: 07:00- 16:00 horas
Tríplice viral	Quartas-feiras: 08:00- 16 horas (otimização dos frascos de 10 doses)
	Segunda a sexta-feira: 07:00- 16:00 horas em caso de frascos com dose única.
DTP	Segunda a sexta-feira: 07:00- 16:00 horas
HPV	Segunda a sexta-feira: 07:00- 16:00 horas
Dupla adulto	Segunda a sexta-feira: 07:00- 16:00 horas
Febre amarela	Quartas-feiras: 08:00- 16 horas (otimização das doses)
DTPa	Segunda a sexta-feira: 07:00- 16:00 horas
Vacina contra a raiva	<i>Essa vacina é ofertada somente na ESF Sede/ Ama de segunda a sexta-feira: 07:20- 16:00 horas</i> <i>Hospital Concórdia: horário integral</i>
Vacina gripe (influenza)	Vacina disponibilizada em período de campanha: 13 de abril a 15 de maio de 2020, sendo dia 25 de abril, o dia D de mobilização nacional.

SALA DE VACINA ESF RIO POSSMOSER- HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO	
VACINAS	PERÍODO DE APLICAÇÃO
BCG	<i>Essa vacina é ofertada somente na Sala de vacina da Sede/Ama de segunda a sexta 07:00- 11:00 horas</i>
Hepatite B	Segunda a sexta-feira: 08:00- 10:30 e 12:00-15:30 horas
Pólio oral (VOP)	Segunda a sexta-feira: 08:00- 10:30 e 12:00-15:30 horas
Pólio inativa (VIP)	Segunda a sexta-feira: 08:00- 10:30 e 12:00-15:30 horas
Rota vírus	Segunda a sexta-feira: 08:00- 10:30 e 12:00-15:30 horas
Pneumocócica 10	Segunda a sexta-feira: 08:00- 10:30 e 12:00-15:30 horas
Pentavalente	Segunda a sexta-feira: 08:00- 10:30 e 12:00-15:30 horas
Meningocócica C	Segunda a sexta-feira: 08:00- 10:30 e 12:00-15:30 horas
Tríplice viral	Vacina feita com agendamento prévio para otimização das doses
DTP	Segunda a sexta-feira: 08:00- 10:30 e 12:00-15:30 horas
HPV	Segunda a sexta-feira: 08:00- 10:30 e 12:00-15:30 horas
Dupla adulto	Segunda a sexta-feira: 08:00- 10:30 e 12:00-15:30 horas
Febre amarela	Vacina feita com agendamento prévio na ESF para otimização das doses
DTPa	Segunda a sexta-feira: 08:00- 10:30 e 12:00-15:30 horas
Vacina contra a raiva	<i>Essa vacina é ofertada somente na ESF Sede/ Ama de segunda a sexta-feira: 07:20- 16:00 horas Hospital Concórdia: horário integral</i>
Vacina gripe (influenza)	Vacina disponibilizada em período de campanha: 13 de abril a 15 de maio de 2020, sendo dia 25 de abril, o dia D de mobilização nacional

SALA DE VACINA ESF CARAMURU- HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO	
VACINAS	PERÍODO DE APLICAÇÃO
BCG	<i>Essa vacina é ofertada somente na Sala de vacina da Sede/Ama de segunda a sexta 07:00- 11:00 horas</i>
Hepatite B	Segunda-feira: 09:00- 10:30 horas e terça a sexta-feira: 08:00-10:30 e 12:00- 18:00

	horas
Pólio oral (VOP)	Segunda-feira: 09:00- 10:30 horas e terça a sexta-feira: 08:00-10:30 e 12:00- 18:00 horas
Pólio inativa (VIP)	Segunda-feira: 09:00- 10:30 horas e terça a sexta-feira: 08:00-10:30 e 12:00- 18:00 horas
Rota vírus	Segunda-feira: 09:00- 10:30 horas e terça a sexta-feira: 08:00-10:30 e 12:00- 18:00 horas
Pneumocócica 10	Segunda-feira: 09:00- 10:30 horas e terça a sexta-feira: 08:00-10:30 e 12:00- 18:00 horas
Pentavalente	Segunda-feira: 09:00- 10:30 horas e terça a sexta-feira: 08:00-10:30 e 12:00- 18:00 horas
Meningocócica C	Segunda-feira: 09:00- 10:30 horas e terça a sexta-feira: 08:00-10:30 e 12:00- 18:00 horas
Tríplice viral	Vacina feita com agendamento prévio para otimização das doses
DTP	Segunda-feira: 09:00- 10:30 horas e terça a sexta-feira: 08:00-10:30 e 12:00- 18:00 horas
HPV	Segunda-feira: 09:00- 10:30 horas e terça a sexta-feira: 08:00-10:30 e 12:00- 18:00 horas
Dupla adulto	Segunda-feira: 09:00- 10:30 horas e terça a sexta-feira: 08:00-10:30 e 12:00- 18:00 horas
Febre amarela	Vacina feita as com agendamento prévio para otimização das doses
DTPa	
Vacina contra a raiva	<i>Essa vacina é ofertada somente na ESF Sede/ Ama de segunda a sexta-feira: 07:20-16:00 horas</i> <i>Hospital Concórdia: horário integral</i>
Vacina influenza (gripe)	Vacina disponibilizada em período de campanha: 13 de abril a 15 de maio de 2020, sendo dia 25 de abril, o dia D de mobilização nacional

SALA DE VACINA ESF SÃO LUÍS- HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO	
VACINAS	PERÍODO DE APLICAÇÃO
BCG	<i>Essa vacina é ofertada somente na Sala de vacina da Sede/Ama de segunda a sexta 07:00- 11:00 horas</i>
Hepatite B	Segunda-feira: 09:00- 15:30 horas Terça-feira a sexta-feira: 07:00-15:30 horas
Pólio oral (VOP)	Pacientes são orientados a se deslocarem para a sala de vacina da sede para receber essa vacina
Pólio inativa (VIP)	Segunda-feira: 09:00- 15:30 horas e Terça-feira a sexta-feira: 07:00-15:30 horas
Rota vírus	Segunda-feira: 09:00- 15:30 horas e Terça-feira a sexta-feira: 07:00-15:30 horas
Pneumocócica 10	Segunda-feira: 09:00- 15:30 horas e Terça-feira a sexta-feira: 07:00-15:30 horas
Pentavalente	Segunda-feira: 09:00- 15:30 horas e Terça-feira a sexta-feira: 07:00-15:30 horas
Meningocócica C	Segunda-feira: 09:00- 15:30 horas e Terça-feira a sexta-feira: 07:00-15:30 horas
Tríplice viral	Segunda-feira: 09:00- 15:30 horas e Terça-feira a sexta-feira: 07:00-15:30 horas
DTP	Segunda-feira: 09:00- 15:30 horas e Terça-feira a sexta-feira: 07:00-15:30 horas
HPV	Segunda-feira: 09:00- 15:30 horas e Terça-feira a sexta-feira: 07:00-15:30 horas
Dupla adulto	Segunda-feira: 09:00- 15:30 horas e Terça-feira a sexta-feira: 07:00-15:30 horas
Febre amarela	Somente às segundas-feiras: 09:00-15:30 horas
DTPa	Segunda-feira: 09:00- 15:30 horas e Terça-feira a sexta-feira: 07:00-15:30 horas
Vacina contra a raiva	<i>Essa vacina é ofertada somente na ESF Sede/ Ama de segunda a sexta-feira: 07:20- 16:00 horas</i> <i>Hospital Concórdia: horário integral</i>
Influenza (gripe)	Vacina disponibilizada em período de campanha: 13 de abril a 15 de maio de 2020, sendo dia 25 de abril, o dia D de mobilização nacional

SALA DE VACINA ESF RECREIO- HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO	
VACINAS	PERÍODO DE APLICAÇÃO
BCG	<i>Essa vacina é ofertada somente na Sala de vacina da Sede/Ama de segunda a sexta 07:00- 11:00 horas</i>
Hepatite B	Segunda a sexta-feira: 09:00- 18:00 horas e Terça a sexta-feira: 07:00-16:00 horas
Pólio oral (VOP)	Vacina feita com agendamento prévio na ESF para otimização das doses
Pólio inativa (VIP)	Segunda a sexta-feira: 09:00- 18:00 horas e Terça a sexta-feira: 07:00-16:00 horas
Rota vírus	Segunda a sexta-feira: 09:00- 18:00 horas e Terça a sexta-feira: 07:00-16:00 horas
Pneumocócica 10	Segunda a sexta-feira: 09:00- 18:00 horas e Terça a sexta-feira: 07:00-16:00 horas
Pentavalente	Segunda a sexta-feira: 09:00- 18:00 horas e Terça a sexta-feira: 07:00-16:00 horas
Meningocócica C	Segunda a sexta-feira: 09:00- 18:00 horas e Terça a sexta-feira: 07:00-16:00 horas
Tríplice viral	Vacina feita com agendamento prévio nas ESFs para otimização das doses
DTP	Segunda a sexta-feira: 09:00- 18:00 horas e Terça a sexta-feira: 07:00-16:00 horas
HPV	Segunda a sexta-feira: 09:00- 18:00 horas e Terça a sexta-feira: 07:00-16:00 horas
Dupla adulto	Segunda a sexta-feira: 09:00- 18:00 horas e Terça a sexta-feira: 07:00-16:00 horas
Febre amarela	Vacina feita com agendamento prévio na ESF para otimização das doses
DTPa	Segunda a sexta-feira: 09:00- 18:00 horas e Terça a sexta-feira: 07:00-16:00 horas
Vacina contra a raiva	<i>Essa vacina é ofertada somente na ESF Sede/ Ama de segunda a sexta-feira: 07:20- 16:00 horas</i> <i>Hospital Concórdia: horário integral</i>
Influenza (gripe)	Vacina disponibilizada em período de campanha: 13 de abril a 15 de maio de 2020, sendo dia 25 de abril, o dia D de mobilização nacional

SALA DE VACINA ESF SÃO JOÃO DO GARRAFÃO- HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO	
VACINAS	PERÍODO DE APLICAÇÃO
BCG	<i>Essa vacina é ofertada somente na Sala de vacina da Sede/Ama de segunda</i>

	<i>a sexta 07:00- 11:00 horas</i>
Hepatite B	Vacina feita com agendamento prévio para otimização das doses -Segunda a quinta-feira: 12:00 – 15:00 horas
Pólio oral (VOP)	Vacina feita com agendamento prévio na ESF para otimização das doses
Pólio inativa (VIP)	-Segunda a quinta-feira: 12:00 – 15:00 horas
Rota vírus	-Segunda a quinta-feira: 12:00 – 15:00 horas
Pneumocócica 10	-Segunda a quinta-feira: 12:00 – 15:00 horas
Pentavalente	-Segunda a quinta-feira: 12:00 – 15:00 horas
Meningocócica C	-Segunda a quinta-feira: 12:00 – 15:00 horas
Tríplice viral	Vacina feita com agendamento prévio para otimização das doses
DTP	-Segunda a quinta-feira: 12:00 – 15:00 horas
HPV	-Segunda a quinta-feira: 12:00 – 15:00 horas
Dupla adulto	Vacina feita com agendamento prévio para otimização das doses - Agenda uma vez por mês, em caso de acidente- atendimento imediato
Febre amarela	Vacina feita com agendamento prévio para otimização das doses
DTPa	-Segunda a quinta-feira: 12:00 – 15:00 horas
Vacina contra a raiva	<i>Essa vacina é ofertada somente na ESF Sede/ Ama de segunda a sexta-feira: 07:20- 16:00 horas Hospital Concórdia: horário integral</i>
Influenza (gripe)	Vacina disponibilizada em período de campanha: 13 de abril a 15 de maio de 2020, sendo dia 25 de abril, o dia D de mobilização nacional

SALA DE VACINA ESF RIO LAMEGO- HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

VACINAS	PERÍODO DE APLICAÇÃO
BCG	<i>Essa vacina é ofertada somente na Sala de vacina da Sede/Ama de segunda a sexta 07:00- 11:00 horas</i>
Hepatite B	Quartas –feiras: 07:00- 10:30 e 12:00-15:00 horas
Pólio oral (VOP)	Vacina feita com agendamento prévio na ESF para otimização das doses
Pólio inativa (VIP)	Quartas –feiras: 07:00- 10:30 e 12:00-15:00 horas
Rota vírus	Quartas –feiras: 07:00- 10:30 e 12:00-15:00 horas
Pneumocócica 10	Quartas –feiras: 07:00- 10:30 e 12:00-15:00 horas
Pentavalente	Quartas –feiras: 07:00- 10:30 e 12:00-15:00 horas
Meningocócica C	Quartas –feiras: 07:00- 10:30 e 12:00-15:00 horas
Tríplice viral	Quartas –feiras: 07:00- 10:30 e 12:00-15:00 horas
DTP	Quartas –feiras: 07:00- 10:30 e 12:00-15:00 horas
HPV	Quartas –feiras: 07:00- 10:30 e 12:00-15:00 horas
Dupla adulto	Quartas –feiras: 07:00- 10:30 e 12:00-15:00 horas
Febre amarela	Vacina feita com agendamento prévio na ESF para otimização das doses
DTPa	Quartas –feiras: 07:00- 10:30 e 12:00-15:00 horas
Vacina contra a raiva	<i>Essa vacina é ofertada somente na ESF Sede/ Ama de segunda a sexta-feira: 07:20- 16:00 horas Hospital Concórdia: horário integral</i>
Influenza (gripe)	Vacina disponibilizada em período de campanha: 13 de abril a 15 de maio de 2020, sendo dia 25 de abril, o dia D de mobilização nacional

SALA DE VACINA ESF ALTO SANTA MARIA- HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO	
VACINAS	PERÍODO DE APLICAÇÃO
BCG	<i>Essa vacina é ofertada somente na Sala de vacina da Sede/Ama de segunda a sexta 07:00- 11:00 horas</i>
Hepatite B	Segunda A sexta-feira: 07:00-16:00 horas
Pólio oral (VOP)	Vacina feita com agendamento prévio na ESF para otimização das doses
Pólio inativa (VIP)	Segunda a sexta-feira: 07:00-16:00 horas
Rota vírus	Segunda a sexta-feira: 07:00-16:00 horas
Pneumocócica 10	Segunda a sexta-feira: 07:00-16:00 horas
Pentavalente	Segunda a sexta-feira: 07:00-16:00 horas
Meningocócica C	Segunda a sexta-feira: 07:00-16:00 horas
Tríplice viral	Segunda a sexta-feira: 07:00-16:00 horas
DTP	Segunda a sexta-feira: 07:00-16:00 horas
HPV	Segunda a sexta-feira: 07:00-16:00 horas
Dupla adulto	Segunda a sexta-feira: 07:00-16:00 horas
Febre amarela	Vacina feita com agendamento prévio na ESF para otimização das doses
DTPa	Segunda a sexta-feira: 07:00-16:00 horas
Vacina contra a raiva	<i>Essa vacina é ofertada somente na ESF Sede/ Ama de segunda a sexta-feira: 07:20- 16:00 horas</i> <i>Hospital Concórdia: horário integral</i>
Influenza (gripe)	Vacina disponibilizada em período de campanha: 13 de abril a 15 de maio de 2020, sendo dia 25 de abril, o dia D de mobilização nacional

SALA DE VACINA ESF VILA NOVA E JETIBÁ- HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

VACINAS	PERÍODO DE APLICAÇÃO
BCG	<i>Essa vacina é ofertada somente na Sala de vacina da Sede/Ama de segunda a sexta 07:00- 11:00 horas</i>
Hepatite B	Segunda a sexta-feira: 07:00-10:30 e 13:00-15:30 horas
Pólio oral (VOP)	Os pacientes são encaminhados para a sala de vacina Sede/AMA para a administração dessa vacina
Pólio inativa (VIP)	Segunda a sexta-feira: 07:00-10:30 e 13:00-15:30 horas
Rota vírus	Segunda a sexta-feira: 07:00-10:30 e 13:00-15:30 horas
Pneumocócica 10	Segunda a sexta-feira: 07:00-10:30 e 13:00-15:30 horas
Pentavalente	Segunda a sexta-feira: 07:00-10:30 e 13:00-15:30 horas
Meningocócica C	Segunda a sexta-feira: 07:00-10:30 e 13:00-15:30 horas
Tríplice viral	Segunda a sexta-feira: 07:00-10:30 e 13:00-15:30 horas
DTP	Segunda a sexta-feira: 07:00-10:30 e 13:00-15:30 horas
HPV	Segunda a sexta-feira: 07:00-10:30 e 13:00-15:30 horas
Dupla adulto	Segunda a sexta-feira: 07:00-10:30 e 13:00-15:30 horas
Febre amarela	Vacina feita com agendamento prévio na ESF para otimização das doses
DTPa	Segunda a sexta-feira: 07:00-10:30 e 13:00-15:30 horas
Vacina contra a raiva	<i>Essa vacina é ofertada somente na ESF Sede/ Ama de segunda a sexta-feira: 07:20- 16:00 horas</i> <i>Hospital Concórdia: horário integral</i>
Influenza (gripe)	Vacina disponibilizada em período de campanha: 13 de abril a 15 de maio de 2020, sendo dia 25 de abril, o dia D de mobilização nacional

OBS: nesse mês de janeiro, devido ao período de férias de alguns profissionais, a sala de vacina está funcionando somente às sextas-feiras de 07:00 até 16:00 horas, permanecendo o agendamento prévio das vacinas VOP e febre amarela para otimizar as doses.

SALA DE VACINA ESF BELÉM- HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO	
VACINAS	PERÍODO DE APLICAÇÃO
BCG	<i>Essa vacina é ofertada somente na Sala de vacina da Sede/Ama de segunda a sexta 07:00- 11:00 horas</i>
Hepatite B	Quartas-feiras: 07:30- 15:30
Pólio oral (VOP)	Quartas-feiras: 07:30- 15:30
Pólio inativa (VIP)	Quartas-feiras: 07:30- 15:30
Rota vírus	Quartas-feiras: 07:30- 15:30
Pneumocócica 10	Quartas-feiras: 07:30- 15:30
Pentavalente	Quartas-feiras: 07:30- 15:30
Meningocócica C	Quartas-feiras: 07:30- 15:30
Tríplice viral	Quartas-feiras: 07:30- 15:30
DTP	Quartas-feiras: 07:30- 15:30horas
HPV	Quartas-feiras: 07:30- 15:30
Dupla adulto	Quartas-feiras: 07:30- 15:30
Febre amarela	Quartas-feiras: 07:30- 15:30
DTPa	Quartas-feiras: 07:30- 15:30
Vacina contra a raiva	<i>Essa vacina é ofertada somente na ESF Sede/ Ama de segunda a sexta-feira: 07:20- 16:00 horas Hospital Concórdia: horário integral</i>
Influenza (gripe)	Vacina disponibilizada em período de campanha: 13 de abril a 15 de maio de 2020, sendo dia 25 de abril, o dia D de mobilização nacional

OBS: devido as férias do auxiliar de enfermagem, o horário de funcionamento da sala de vacina foi reduzido para toda quarta-feira

SALA DE VACINA ESF ALTO SÃO SEBASTIÃO- HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

VACINAS	PERÍODO DE APLICAÇÃO
BCG	<i>Essa vacina é ofertada somente na Sala de vacina da Sede/Ama de segunda a sexta 07:00- 11:00 horas</i>
Hepatite B	Segunda a sexta-feira: 07:00-10:30 e 13:00-15:30 horas
Pólio oral (VOP)	Os pacientes são encaminhados para a sala de vacina Sede/AMA para a administração dessa vacina
Pólio inativa (VIP)	Segunda a sexta-feira: 07:00-10:30 e 13:00-15:30 horas
Rota vírus	Segunda a sexta-feira: 07:00-10:30 e 13:00-15:30 horas
Pneumocócica 10	Segunda a sexta-feira: 07:00-10:30 e 13:00-15:30 horas
Pentavalente	Segunda a sexta-feira: 07:00-10:30 e 13:00-15:30 horas
Meningocócica C	Segunda a sexta-feira: 07:00-10:30 e 13:00-15:30 horas
Tríplice viral	Segunda a sexta-feira: 07:00-10:30 e 13:00-15:30 horas
DTP	Segunda a sexta-feira: 07:00-10:30 e 13:00-15:30 horas
HPV	Segunda a sexta-feira: 07:00-10:30 e 13:00-15:30 horas
Dupla adulto	Segunda a sexta-feira: 07:00-10:30 e 13:00-15:30 horas
Febre amarela	Vacina feita com agendamento prévio na ESF para otimização das doses
DTPa	Segunda a sexta-feira: 07:00-10:30 e 13:00-15:30 horas
Vacina contra a raiva	<i>Essa vacina é ofertada somente na ESF Sede/ Ama de segunda a sexta-feira: 07:20- 16:00 horas Hospital Concórdia: horário integral</i>
Influenza (gripe)	Vacina disponibilizada em período de campanha: 13 de abril a 15 de maio de 2020, sendo dia 25 de abril, o dia D de mobilização nacional

ANEXO II- CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO 2020

CALENDÁRIO VACINAÇÃO CRIANÇA 2020			
IDADE	VACINA	DOSES	DOENÇAS EVITADAS
Ao nascer	BCG – ID	Dose única	Formas graves de tuberculose

	Vacina hepatite B	Dose	Hepatite B
02 meses	Vacina pentavalente (DTP + HB + Hib)	1ª dose	Difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite e outras infecções causadas pelo Haemophilus influenzae tipo b.
	VIP (vacina inativada poliomielite)		Poliomielite (paralisia infantil)
	VORH (Vacina Oral de Rotavírus Humano)		Diarreia por Rotavírus
	Vacina pneumocócica 10 (valente)		Doenças invasivas e otite média aguda causadas por Streptococcus pneumoniae sorotipos 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F e 23F.
03 meses	Vacina meningocócica C (conjugada)	1ª dose	Doenças invasivas causadas por Neisseria meningitidis do sorogrupo C.
4 meses	Vacina pentavalente (DTP + HB + Hib)	2ª dose	Difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite e outras infecções causadas pelo Haemophilus influenzae tipo b.
	VIP (vacina inativada poliomielite)		Poliomielite (paralisia infantil)
	VORH (Vacina Oral de Rotavírus Humano)		Diarreia por Rotavírus
	Vacina pneumocócica 10 (valente)		Doenças invasivas e otite média aguda causadas por Streptococcus pneumoniae sorotipos 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F e 23F.
05 meses	Vacina meningocócica C (conjugada)	2ª dose	Doenças invasivas causadas por Neisseria meningitidis do sorogrupo C.
06 meses	Vacina pentavalente (DTP + HB + Hib)	3ª dose	Difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite e outras infecções causadas pelo Haemophilus influenzae tipo b.
	VIP (vacina inativada poliomielite)		Poliomielite (paralisia infantil)
	VORH (Vacina Oral de Rotavírus Humano)		Diarreia por Rotavírus
	Vacina pneumocócica 10 (valente)		Doenças invasivas e otite média aguda causadas por Streptococcus pneumoniae sorotipos 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F e 23F.
09 meses	Vacina febre amarela	Dose inicial	Febre amarela
12 meses	SRC (tríplice viral)	1ª dose	Sarampo, caxumba e rubéola
	Vacina pneumocócica 10 valente	Reforço	Contra doenças invasivas e otite média aguda causadas por Streptococcus pneumoniae sorotipos 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F e 23F.
	Vacina meningocócica C (conjugada)	Reforço	Doenças invasivas causadas por Neisseria meningitidis do sorogrupo C
15 meses	VOP (vacina oral contra pólio)	1ª reforço	Poliomielite (paralisia infantil)
	Hepatite A	Dose única	Hepatite A
	DTP (tríplice bacteriana).	1ª reforço	Difteria, tétano e coqueluche
	SCRV (tetra viral)	Dose única	Sarampo, caxumba, rubéola e varicela.
04 anos	DTP (tríplice bacteriana).	2ª reforço	Difteria, tétano e coqueluche
	VOP (vacina oral poliomielite)	2ª reforço	Poliomielite (paralisia infantil)
	Vacina varicela	2ª reforço	Varicela (catapora)
	Febre amarela	Reforço	Febre amarela

Meninas de 09 anos até 14 anos, 11 meses e 29 dias	HPV quadrivalente	2 doses	Infecções pelo Papilomavírus Humano 6, 11, 16 e 18
Vacina influenza/campanha 2020: : crianças de 06 meses a crianças de 05 anos			

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO DO ADOLESCENTE			
Idade	Vacina	Doses	Doenças evitadas
11 a 19 anos	Hepatite B – a depender da situação vacinal	3 doses	Hepatite B
	Dupla adulto (dT) – a depender da situação vacinal	3 doses ou reforço	Difteria e tétano
	Tríplice viral (SCR) – a depender da situação vacinal	2 doses	Sarampo, caxumba e rubéola
	Febre amarela – a depender da situação vacinal	Dose única	Febre amarela
11 a 14 anos (meninos)	HPV quadrivalente	2 doses	Infecções pelo Papilomavírus Humano 6, 11, 16 e 18
11 a 14 anos (meninos e meninas)	Vacina meningocócica C (conjugada)	Reforço ou Dose única	Doenças invasivas causadas por <i>Neisseria meningitidis</i> do sorogrupo C.

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO DO ADULTO			
Idade	Vacina	Doses	Doenças evitadas
20 a 59 anos	Hepatite B – a depender da situação vacinal	3 doses	Hepatite B
	Dupla adulto (dT) – a depender da situação vacinal	3 doses ou reforço	Difteria e tétano
	Febre amarela – a depender da situação vacinal	Dose única	Febre amarela
20 a 59 anos	Tríplice viral (SCR) – a depender da situação	2 doses até 29 anos 11 meses e	Sarampo, caxumba e rubéola

	vacinal	29 dias	
		1 dose a partir de 30 anos de idade	

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO DA GESTANTE			
Idade	Vacina	Doses	Doenças evitadas
Gestante	Hepatite B – a depender da situação vacinal	3 doses	Hepatite B
	Dupla adulto (dT) – a depender da situação vacinal	3 doses ou reforço	Difteria e tétano
	DTpa	Dose única em cada gestação	Difteria, tétano e coqueluche
	Infuenza	Dose anual	Gripe

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO DO IDOSO			
Idade	Vacina	Doses	Doenças evitadas
60 anos ou mais	Hepatite B – a depender da situação vacinal	3 doses	Hepatite B
	Dupla adulto (dT) – a depender da situação vacinal	3 doses ou reforço	Difteria e tétano
	Infuenza	Dose anual	Gripe

ANEXO III- RESUMO DAS INDICAÇÕES DO CRIE, POR IMUNOBIOLOGICO

1 Vacina inativada da poliomielite (VIP)

- Crianças imunodeprimidas (com deficiência imunológica congênita ou adquirida) não vacinadas ou que receberam esquema incompleto de vacinação contra poliomielite;
- Crianças que estejam em contato domiciliar ou hospitalar com pessoa imunodeprimida;
- Pessoas submetidas a transplante de órgãos sólidos ou de células-tronco hematopoiéticas (medula óssea);
- Recém-nascidos e lactentes que permaneçam internados em unidade neonatal por ocasião da idade de vacinação contra a poliomielite;
- Crianças com história de paralisia flácida associada a vacina, após dose anterior de VOP (vacina oral da poliomielite); Obs.: Filhos de mãe HIV positivo antes da definição diagnóstica e crianças com HIV/AIDS devem receber a VIP.

2 Vacina hepatite B (HB) e imunoglobulina humana anti-hepatite B (IGHAHB)

Vacina Hepatite B, para indivíduos suscetíveis:

- Pessoas vivendo com HIV/AIDS;
 - Asplenia anatômica ou funcional e doenças relacionadas;
 - Convívio domiciliar contínuo com pessoas portadoras de vírus da Hepatite B – VHB;
 - Doadores de órgãos sólidos ou de células-tronco hematopoiéticas (medula óssea);
 - Imunodeficiência congênita ou adquirida;
 - Diabetes mellitus;
 - Doadores de sangue;
 - Doenças autoimunes;
 - Fibrose cística (mucoviscidose);
 - Portadores de hepatopatias crônicas e Hepatite C;
 - Portadores de doenças renais crônicas/diálise/hemodiálise/síndrome nefrótica.
 - Transplantados de órgãos sólidos ou de células-tronco hematopoiéticas (medula óssea).
 - Vitimas de violência sexual. • Vitimas de acidentes com material biológico positivo ou fortemente suspeito de infecção por VHB.
 - Comunicantes sexuais de portadores de VHB
- Imunoglobulina Humana Anti-Hepatite B, para indivíduos suscetíveis:**
- Prevenção da infecção perinatal pelo vírus da hepatite B.
 - Vitimas de acidentes com material biológico positivo ou fortemente suspeito de infecção por VHB. • Comunicantes sexuais de casos agudos de hepatite B.
 - Vitimas de violência sexual.
 - Imunodeprimidos após exposição de risco, mesmo que previamente vacinados.
- Transplantados de fígado infectados pelo vírus da Hepatite B: O uso da IGHAB em pacientes infectados pelo VHB submetidos a transplante de fígado é regulamentado pela Portaria nº 86, de 5 de fevereiro de 2002, da Secretaria de Assistência à Saúde e esta indicação não é de responsabilidade dos CRIE. OBs1: a imunoglobulina não tem qualquer indicação terapêutica. Seu uso tem finalidade exclusivamente profilática. Obs2: o transporte dos insumos para pacientes internados é de responsabilidade do hospital que atende o paciente.

3 Vacina Hepatite A (HA)

- Hepatopatias crônicas de qualquer etiologia, inclusive portadores do vírus da hepatite C (VHC).
- Portadores crônicos do VHB.
- Coagulopatias.
- Pacientes com HIV/AIDS.
- Imunodepressão terapêutica ou por doença imunodepressora.
- Doenças de depósito.
- Fibrose cística (mucoviscidose).
- Trissomias.
- Candidatos a transplante de órgão sólido, cadastrados em programas de transplantes.
- Transplantados de órgão sólido ou de células-tronco hematopoiéticas (medula óssea).
- Doadores de órgão sólido ou de células-tronco hematopoiéticas (medula óssea), cadastrados em programas de transplantes.
- Hemoglobinopatias

4 Vacina Varicela (VZ) e Imunoglobulina Humana Antivaricela-Zoster (IGHVZ)

Vacina Varicela, pré-exposição:

- Pessoas imunocompetentes de grupos especiais de risco (profissionais de saúde, cuidadores e familiares) suscetíveis à doença que estejam em convívio domiciliar ou hospitalar com pacientes imunodeprimidos;
- Maiores de 1 ano de idade imunocompetentes e suscetíveis a doença, no momento da internação onde haja caso de varicela;
- Candidatos a transplante de órgãos, suscetíveis a doença, até pelo menos três semanas antes do procedimento, desde que não estejam imunodeprimidos.
- Nefropatias crônicas;
- Síndrome nefrótica;
- Doadores de órgãos sólidos e de células-tronco hematopoiéticas (medula óssea).

- Receptores de transplante de células-troncohematopoiéticas (medula óssea): para pacientes transplantados há 24 meses ou mais, sendo contraindicada quando houver doença enxerto versus hospedeiro;
- Crianças e adolescentes infectados pelo HIV suscetíveis a varicela nas categorias clínicas (CDC) N, A e B com CD4 > 15%. Recomenda-se a vacinação de crianças expostas, mesmo já excluída a infecção pelo HIV, para prevenir a transmissão da varicela em contato domiciliar com imunodeprimidos;
- Pacientes com deficiência isolada de imunidade humoral (com imunidade celular preservada);
- Doenças dermatológicas graves, tais como: ictiose, epidermólise bolhosa, psoríase, dermatite atópica grave e outras assemelhadas;
- Uso crônico de ácido acetilsalicílico (suspender uso por seis semanas após a vacinação);
- Asplenia anatômica e funcional e doenças relacionadas;
- Trissomias.

Vacina Varicela, pós-exposição:

- A vacina é indicada para controle de surto em ambiente hospitalar, nos comunicantes suscetíveis imunocompetentes maiores de 9 meses de idade, até 120 horas (cinco dias) após o contato.

Imunoglobulina pós-exposição:

A sua utilização, administrada até 96 horas após o contato, depende do atendimento de três condições, a saber: suscetibilidade, contato significativo e condição especial de risco, como definidas a seguir:

Que o comunicante seja suscetível, isto é:

- Pessoas imunocompetentes e imunodeprimidas sem história bem definida da doença e/ou de vacinação anterior.
- Pessoas com imunodepressão celular grave, independentemente de história anterior de varicela.

Que tenha havido contato significativo com o vírus varicela zoster, isto é:

- Contato domiciliar contínuo: permanência com o doente durante pelo menos 1 hora em ambiente fechado.
- Contato hospitalar: pessoas internadas no mesmo quarto do doente ou que tenham mantido com ele contato direto prolongado, de pelo menos 1 hora.

Que o suscetível seja pessoa com risco especial de varicela grave, isto é:

- Crianças ou adultos imunodeprimidos.
- Gestantes.
- Menores de 1 ano de idade, em contato hospitalar com varicela.
- Recém-nascidos de mães nas quais o início da varicela ocorreu nos cinco últimos dias de gestação ou até 48 horas depois do parto.
- Recém-nascidos prematuros, com 28 ou mais semanas de gestação, cuja mãe nunca teve varicela.

- Recém-nascidos prematuros, com menos de 28 semanas de gestação (ou com menos de 1.000 g ao nascimento), independentemente de história materna de varicela.

OBs1: a imunoglobulina não tem qualquer indicação terapêutica. Seu uso tem finalidade exclusivamente profilática.

Obs2: o transporte dos insumos para pacientes internados é de responsabilidade do hospital que atende o paciente.

5 Imunoglobulina Humana Antirrábica (IGHR)

- Indivíduos que apresentaram algum tipo de hipersensibilidade quando da utilização de soro heterólogo (antitetânico, antirrábico, antidiftérico, antiofídico, entre outros).
- Indivíduos que não completaram esquema antirrábico por eventos adversos a vacina.
- Indivíduos imunodeprimidos – na situação de pós-exposição, sempre que houver indicação de vacinação antirrábica.

6 Vacina influenza inativada (INF) – “Vacina da Gripe”

- HIV/Aids.
- Transplantados de órgãos sólidos e de células-tronco hematopoiéticas (medula óssea);
- Doadores de órgãos sólidos e de células-tronco hematopoiético (medula óssea), devidamente cadastrado no programa de doação;
- Imunodeficiências congênitas;
- Imunodepressão devido ao câncer ou a imunodepressão terapêutica;

- Comunicantes domiciliares de imunodeprimidos.
- Trabalhadores de saúde;
- Cardiopatias crônicas;
- Pneumopatias crônicas;
- Asplenia anatômica ou funcional e doenças relacionadas.
- Diabetes mellitus.
- Fibrose cística. • Trissomias.
- Implante de cóclea. • Doenças neurológicas crônicas incapacitantes.
- Usuários crônicos de ácido acetilsalicílico.
- Nefropatia crônica / síndrome nefrótica.
- Asma.
- Hepatopatias crônicas.

7 Vacinas pneumococo (polissacarídica 23-valente e conjugada 10-valente)

- **Pn23 para maiores de 02 anos de idade, dose única e com revacinação indicada uma única vez 5 anos após a dose inicial.**
- **Pnc10 para crianças com idade até 4 anos 11 meses e 29 dias, e esquema de acordo com a idade em que inicia a vacinação.**
- HIV/AIDS.
- Asplenia anatômica ou funcional e doenças relacionadas.
- Pneumopatias crônicas, exceto asma intermitente ou persistente leve.
- Asma persistente moderada ou grave. • Cardiopatias crônicas.
- Nefropatias crônicas / hemodiálise / síndrome nefrótica.
- Transplantados de órgãos sólidos ou de células-tronco hematopoiéticas (medula óssea). • Imunodeficiência devido ao câncer ou a imunodepressão terapêutica.
- Diabetes mellitus.
- Fistula líquórica.
- Fibrose cística (mucoviscidose).
- Doenças neurológicas crônicas incapacitantes.
- Implante de cóclea.
- Trissomias.

- Imunodeficiências congênitas.
- Hepatopatias crônicas.
- Doenças de depósito. Obs.: Nos casos de esplenectomia eletiva, a vacina deve ser aplicada pelo menos duas semanas antes da cirurgia. Em casos de quimioterapia, a vacina deve ser aplicada, preferencialmente, 15 dias antes do início da quimioterapia (QT).

8 Vacina Haemophilus influenzae tipo b (Hib)

Nas indicações de substituição de pentavalente por DTP acelular + Hib + HB. B. Transplantados de células-tronco hematopoiéticas (medula óssea), independente da idade. C. Nos menores de 19 anos, não previamente vacinados, nas seguintes situações:

- HIV/AIDS.
- Imunodeficiência congênita isolada de tipo humoral ou deficiência de complemento.
- Imunodepressão terapêutica ou devido ao câncer.
- Asplenia anatômica ou funcional e doenças relacionadas.
- Diabetes mellitus.
- Nefropatias crônicas / hemodiálise / síndrome nefrótica.
- Trissomias.
- Cardiopatia crônica.
- Pneumopatia crônica.
- Asma persistente moderada ou grave.
- Fibrose cística.
- Fístula liquórica.
- Doenças de depósito.
- Transplantados de órgãos sólidos.
- Doença neurológica incapacitante.
- Implante de cóclea.

9 Vacina tríplice acelular bacteriana (DTPa) – para crianças com idade até 6 anos 11 meses e 29 dias

- Após os seguintes eventos adversos graves ocorridos com a aplicação da vacina adsorvida difteria, tétano e pertússis/ coqueluche (DTP) ou com a vacina

adsorvida difteria, tétano, pertússis (coqueluche), hepatite B e Haemophilus influenzae tipo b (Penta):

- Convulsão febril ou afebril nas primeiras 72 horas após vacinação.
- Síndrome hipotônica hiporresponsiva nas primeiras 48 horas após vacinação. OBs: com preenchimento da ficha de notificação de evento adverso e resposta da Secretaria Estadual de Saúde.

• Para crianças que apresentem risco aumentado de desenvolvimento de eventos graves à vacina adsorvida difteria, tétano e pertússis (DTP) ou com a vacina adsorvida difteria, tétano, pertússis, hepatite B e Haemophilus influenzae tipo b (Penta):

- Doença convulsiva crônica.
- Cardiopatias ou pneumopatias crônicas com risco de descompensação em vigência de febre.
- Doenças neurológicas crônicas incapacitantes.
- Crianças com neoplasias e/ou que necessitem de quimio, radio ou corticoterapia.
- RN que permaneça internado na unidade neonatal por ocasião da idade de vacinação.
- RN prematuro extremo (menor de 1.000 g ou 31 semanas). C. Preferencialmente, nas seguintes situações de imunodepressão:
 - Pacientes com neoplasias e/ou que necessitem de quimioterapia, radioterapia ou corticoterapia.
 - Pacientes com doenças imunomediadas que necessitem de quimioterapia, corticoterapia ou imunoterapia
 - Transplantados de órgãos sólidos e células-tronco hematopoiéticas (medula óssea).

10 Vacina dupla infantil (DT)

Encefalopatia nos sete dias subsequentes a administração de dose anterior de vacina Penta, DTP ou DTP acelular.

11 Imunoglobulina humana antitetânica (IGHAT)

- Indivíduos que apresentaram algum tipo de hipersensibilidade quando da utilização de qualquer soro heterólogo (antitetânico, antirrábico, antidiftérico, antiofídico, entre outros);
- Indivíduos imunodeprimidos, nas indicações de imunoprofilaxia contra o tétano, mesmo que vacinados. Os imunodeprimidos deverão receber sempre a IGHAT no lugar do SAT, devido a meia-vida maior dos anticorpos.
- Recém-nascidos em situações de risco para tétano cujas mães sejam desconhecidas ou não tenham sido adequadamente vacinadas.
- Recém-nascidos prematuros com lesões potencialmente tetanogênicas, independentemente da história vacinal da mãe. Obs.: O uso da IGHAT na rede de saúde, para a profilaxia de rotina de ferimentos tetanogênicos, em adoção no Brasil, deve ser suprida pela rede de saúde e não pelos CRIEs, que atenderão exclusivamente as indicações supracitadas.

12 Vacina meningocócica C conjugada (MncC)

- Asplenia anatômica ou funcional e doenças relacionadas.
- Imunodeficiências congênitas e adquiridas.
- Deficiência de complemento e frações.
- Pessoas com HIV/Aids. • Implante de cóclea.
- Fistula líquórica e derivação ventrículo peritoneal (DVP).
- Trissomias.
- Microbiologista rotineiramente exposto a isolamento de *Neisseria meningitidis*
- Doenças de depósito.
- Hepatopatia crônica.
- Doença neurológica crônica incapacitante.
- Transplante de medula óssea e órgãos sólidos.

13 Vacina HPV quadrivalente

- Indivíduos imunodeprimidos (HIV positivos, oncológicos e transplantados).

14 Vacina vacina pneumocócica 13-valente

- Pacientes que vivem com HIV/Aids;
- Transplantados de células-tronco hematopoiéticas (medula óssea).
- Transplantados de órgãos sólidos
- Pacientes oncológicos